

Medicamentos para revertir la sobredosis de opioides



¿Qué son?

Los medicamentos para revertir una sobredosis de opioides pueden salvar una vida al restablecer la respiración en caso de sobredosis.

Estos medicamentos incluyen la naloxona y el nalmefeno, que vienen en dosis diferentes y se administran vía nasal (atomizador) o intramuscular (inyección).

Todos estos tipos de medicamentos pueden revertir con eficacia una sobredosis de opioide, incluida la sobredosis por consumo de fentanilo.

Las personas pueden usar cualquiera de las opciones de medicamentos para revertir una sobredosis, aunque algunos podrían preferir una dosis o método de administración específicos. Por esto, es fundamental tener acceso a diferentes tipos de medicamentos y estar familiarizado con ellos.

En el siguiente cuadro se describen los medicamentos disponibles, dónde encontrarlos y quién podría usarlos.

| Formas de presentación | Tipos de medicamentos | ¿Dónde encontrarlos? | ¿Quién podría usarlos? |
|---|--------------------------------------|---|--|
| Atomizador intranasal (se aplica en una fosa nasal) | Naloxona (3mg y 4mg) | <ul style="list-style-type: none"> Farmacias minoristas, incluidas las farmacias dentro de grandes tiendas de autoservicio Ciertos departamentos de salud locales o estatales Organizaciones para la reducción de riesgo | <ul style="list-style-type: none"> Personas que consumen drogas Familiares, amigos y miembros de la comunidad de personas que consumen drogas Organizaciones de apoyo para personas que consumen drogas Policías y personal de primeros auxilios Personal escolar |
|  | Naloxona (4mg y 8mg) Nalmefeno | Farmacias | <ul style="list-style-type: none"> Policías y personal de primeros auxilios Personal escolar Familiares, amigos y miembros de la comunidad de personas que consumen drogas Personas con prescripción médica para medicamentos de reversión de sobredosis |
| Solución inyectable para jeringa (se inyecta vía intramuscular) | Naloxona | <ul style="list-style-type: none"> Organizaciones para la reducción de riesgo Centros médicos | <ul style="list-style-type: none"> Personas que consumen drogas Organizaciones de apoyo para personas que consumen drogas Profesionales médicos en hospitales y salas de emergencias Personal de primeros auxilios capacitados para aplicar inyecciones |
|  | Naloxona (5mg) | Farmacias | <ul style="list-style-type: none"> Familiares, amigos y miembros de la comunidad de personas que consumen drogas Personal de primeros auxilios Personal escolar Personas con prescripción médica para medicamentos de reversión de sobredosis |
| Jeringa prellenada (se inyecta vía intramuscular) | | | |
|  | | | |